

LACTANCIA MATERNA CON SÍNDROME DE TUBERÍAS OXIDADAS: ABORDAJE ENFERMERO EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS Y ANÁLISIS DEL MANEJO CLÍNICO.

AUTORES: Rojo Villar, María Elena; Martínez Hernández, María; Pazos Grau, Paula; Madrid Solano, María; Martínez Miravalles, Natalia; Cela Castillo, Julia.

OBJETIVOS

- ❑ **Objetivo general:** Describir el manejo de un caso clínico durante el proceso de lactancia materna con síndrome de tuberías oxidadas en el contexto de urgencias pediátricas.
- ❑ **Objetivo específico:** Analizar el papel de enfermería en su identificación y apoyo a la familia, revisando la evidencia actual disponible para favorecer una atención segura.

CONCLUSIONES

Es fundamental que enfermería pediátrica reconozca las características del síndrome de tuberías oxidadas para evitar la interrupción innecesaria de la lactancia materna y disminuir la ansiedad familiar.

La comunicación efectiva, el acompañamiento emocional, la valoración integral y la capacitación en lactancia son elementos clave para un manejo seguro y basado en la evidencia.

METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica descriptiva sobre el síndrome de tuberías oxidadas y su abordaje clínico.

- ❑ **Búsqueda:** Bases de datos: PubMed, Cochrane Library, Scielo y Dialnet + Descriptores DeCS/MeSH → Total, 8 artículos.
- ❑ **Enfoque ético** en el análisis del caso, basándonos en los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

RESULTADOS:

Caso clínico: Madre acude alertada al servicio de urgencias pediátricas por aparición de leche materna con tonalidad marrón rojiza sin otra sintomatología asociada. Este hallazgo generó incertidumbre entre el personal sanitario, quienes, optaron por suspender la lactancia materna y sustituirla por leche de fórmula.

Diagnóstico clínico: Síndrome de tuberías oxidadas. Condición benigna, transitoria y no dolorosa asociada al proceso de lactogénesis, por lo que no se contraindica la lactancia materna y no supone riesgo alguno para el neonato.

Análisis del caso: puso de manifiesto la necesidad de mejorar la formación del personal sanitario en lactancia materna ante su falta de reconocimiento inicialmente.