

# Bronquiolitis aguda: Valor de la frecuencia respiratoria en el triaje pediátrico

Angulo Oliva, Cristina; Real Jiménez, Rocío; García López, Laura; Lorenzo Gómez, Silvia; Thovar Puebla, María; Anisimov Rodríguez, Julia

< 2 años 60 "

(3) > 2 años 30 "

## INTRODUCCIÓN

La dificultad respiratoria asociada a bronquiolitis (BQL) es uno de los principales motivos de consulta en urgencias pediátricas.

La frecuencia respiratoria (FR) es un parámetro clave, pero su registro en triaje no siempre es realizado.

### OBJETIVO

Analizar el valor de la FR y su uso rutinario en triaje

## MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión bibliográfica en las bases de datos: PubMed y Google Scholar

Criterios inclusión

Palabras clave

Población pediátrica  
Valoración de la FR en triaje  
Artículos en español e inglés



Bronchiolitis  
Respiratory rate monitoring  
Emergency room

16 referencias iniciales  
↓  
12 referencias finales

## RESULTADOS

- 1 La FR es un parámetro esencial de gravedad en bronquiolitis
- 2 El conteo manual presenta limitaciones (llanto, movimiento, tiempo), siendo la constante vital menos registrada

- 3 En el conteo manual se pueden realizar estimaciones según la edad.
- 4 Hay herramientas de apoyo, pero no sustituyen el conteo manual



(2) Frecuencia de medida de las constantes vitales en varios hospitales europeos

## CONCLUSIONES

La medición de la FR debe ser rutinaria en triaje. Existen herramientas que lo facilitan, pero ninguna sustituye al conteo manual. Su correcta medición es un desafío, siendo necesario el desarrollo de métodos de medición precisos, rápidos, reproducibles y adaptados a la práctica clínica real.

## BIBLIOGRAFÍA

